# Stage de Recherche Master 2

Formalismes à six foncteurs

David Kolar Sous la direction de Bernard Le Stum

- Ensembles simpliciaux, fibrations et animation
- ∞-Catégories Structures monoïdales symétriques
- Stabilité et ∞-catégories dérivées

#### 2 Formalismes à six foncteurs abstraits

- CorrespondancesFormalismes à six foncteurs
- Formalismes a six foncteurs
- Construire un contexte géométrique
- Dualités
- Coïncidences

#### 3 Faisceaux cohérents

- Schémas dérivés
- Faisceaux cohérents

# Ensembles simpliciaux

On note  $\Delta$  la catégorie des ensembles ordonnées finis et des applications croissantes.

#### Définition 1.1.1 (Ensemble simplicial)

Un *ensemble simplicial* X est un foncteur  $\Delta^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$ .

Un *n-simplexe* de X est un élément de  $X_n = X([n])$ .

Un sommet de X est un 0-simplexe, une arête de X est un 1-simplexe.

On note  $\Delta^n$  le simplexe standard, représenté par [n].

#### Définition 1.1.2 (Nerf)

Le foncteur nerf sur la catégorie Cat est défini par

$$\begin{array}{cccc} \Delta^{-} & : & \mathbf{Cat} & \to & \mathbf{sSet} \\ & \mathcal{C} & \mapsto & [n] \mapsto \mathrm{Hom}([n], \mathcal{C}) \end{array}$$

#### Définition 1.1.2 (Nerf)

Le foncteur nerf sur la catégorie Cat est défini par

$$\begin{array}{cccc} \Delta^{-} & : & \mathbf{Cat} & \to & \mathbf{sSet} \\ & \mathcal{C} & \mapsto & [n] \mapsto \mathrm{Hom}([n], \mathcal{C}) \end{array}$$

On a 
$$\Delta^n \simeq \Delta^{[n]}$$
.

#### Définition 1.1.2 (Nerf)

Le foncteur nerf sur la catégorie Cat est défini par

$$\begin{array}{cccc} \Delta^{-} & : & \mathbf{Cat} & \to & \mathbf{sSet} \\ & \mathcal{C} & \mapsto & [n] \mapsto \mathrm{Hom}([n], \mathcal{C}) \end{array}$$

On a 
$$\Delta^n \simeq \Delta^{[n]}$$
.

#### Définition 1.1.3 (Frontière)

La frontière d'une simplexe standard  $\Delta^n$  est l'ensemble simplicial

$$\partial \Delta^n = \bigcup_{[m] \subsetneq [n]} \Delta^m$$

#### Définition 1.1.2 (Nerf)

Le foncteur nerf sur la catégorie Cat est défini par

$$\begin{array}{cccc} \Delta^{-} & : & \mathbf{Cat} & \to & \mathbf{sSet} \\ & \mathcal{C} & \mapsto & [n] \mapsto \mathrm{Hom}([n], \mathcal{C}) \end{array}$$

On a 
$$\Delta^n \simeq \Delta^{[n]}$$
.

#### Définition 1.1.3 (Frontière)

La frontière d'une simplexe standard  $\Delta^n$  est l'ensemble simplicial

$$\partial \Delta^n = \bigcup_{[m] \subsetneq [n]} \Delta^m$$

#### Définition 1.1.4 (Corne)

La  $k^e$  corne d'un simplexe standard  $\Delta^n$  est l'ensemble simplicial

$$\Lambda^n_k = \bigcup_{\substack{[m] \subsetneq [n] \\ k \in [m]}} \Delta^m$$

#### Définition 1.1.5 (Fibration intérieure, à gauche, à droite, de Kan)

Pour un morphisme d'ensembles simpliciaux  $f:K\to L$ , on considère, pour  $n\ge 1$ , le problème de relèvement

$$\begin{array}{ccc}
\Lambda_k^n & \longrightarrow & K \\
\downarrow & & \downarrow f \\
\Delta^n & \longrightarrow & L
\end{array}$$

On dit que f est une fibration

#### Définition 1.1.5 (Fibration intérieure, à gauche, à droite, de Kan)

Pour un morphisme d'ensembles simpliciaux  $f:K\to L$ , on considère, pour  $n\ge 1$ , le problème de relèvement

$$\begin{array}{ccc} \Lambda^n_k & \longrightarrow & K \\ \downarrow & & \uparrow & \downarrow f \\ \Delta^n & \longrightarrow & L \end{array}$$

On dit que f est une fibration intérieure lorsque ce problème admet une solution pour 0 < k < n;

#### Définition 1.1.5 (Fibration intérieure, à gauche, à droite, de Kan)

Pour un morphisme d'ensembles simpliciaux  $f:K\to L$ , on considère, pour  $n\ge 1$ , le problème de relèvement

$$\begin{array}{ccc} \Lambda^n_k & \longrightarrow & K \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \Delta^n & \longrightarrow & L \end{array}$$

#### Définition 1.1.5 (Fibration intérieure, à gauche, à droite, de Kan)

Pour un morphisme d'ensembles simpliciaux  $f:K\to L$ , on considère, pour  $n\ge 1$ , le problème de relèvement

$$\begin{array}{ccc}
\Lambda_k^n & \longrightarrow K \\
\downarrow & & \downarrow f \\
\Delta^n & \longrightarrow L
\end{array}$$

On dit que f est une fibration  $intérieure \ lorsque \ ce problème admet une solution pour <math>0 < k < n;$  a  $gauche \ lorsque \ ce problème admet une solution pour <math>0 \le k < n;$  a  $droite \ lorsque \ ce problème admet une solution pour <math>0 < k \le n;$ 

#### Définition 1.1.5 (Fibration intérieure, à gauche, à droite, de Kan)

Pour un morphisme d'ensembles simpliciaux  $f:K\to L$ , on considère, pour  $n\ge 1$ , le problème de relèvement


$$\begin{array}{ccc}
\Lambda_k^n & \longrightarrow & K \\
\downarrow & & & \downarrow f \\
\Delta^n & \longrightarrow & L
\end{array}$$

On dit que f est une fibration intérieure lorsque ce problème admet une solution pour 0 < k < n; à gauche lorsque ce problème admet une solution pour  $0 \le k < n$ ; à droite lorsque ce problème admet une solution pour  $0 < k \le n$ ;

*de Kan* lorsque ce problème admet une solution pour  $0 \le k \le n$ .

#### Définition 1.1.8 (Arête co-cartésienne)


Soit  $f:K\to L$  un morphisme d'ensembles simpliciaux. Une arête e de K est f-co-cartésienne lorsque, pour  $n\ge 2$ , le problème de relèvement



admet une solution.

#### Définition 1.1.8 (Arête co-cartésienne)

Soit  $f:K\to L$  un morphisme d'ensembles simpliciaux. Une arête e de K est f-co-cartésienne lorsque, pour  $n\ge 2$ , le problème de relèvement



admet une solution.

#### Définition 1.1.9 (Fibration co-cartésienne)

Une fibration co-cartésienne est une fibration intérieure  $f:K\to L$  telle que, pour toute arête  $e:S\to T$  de L et tout relèvement  $\tilde{S}$  de S, il existe une arête f-co-cartésienne  $\tilde{e}:\tilde{S}\to \tilde{T}$  relevant e.

#### Définition 1.1.11 (Composantes connexes)

L'ensemble des composantes connexes d'un ensemble simplicial K est l'ensemble  $\pi_0(K)$  des classes d'équivalence de  $K_0$  sous la relation

$$K_1 \xrightarrow{d_1 \times d_0} K_0 \times K_0$$

#### Définition 1.1.11 (Composantes connexes)

L'ensemble des composantes connexes d'un ensemble simplicial K est l'ensemble  $\pi_0(K)$  des classes d'équivalence de  $K_0$  sous la relation

$$K_1 \xrightarrow{d_1 \times d_0} K_0 \times K_0$$


#### Définition 1.1.11 (Lacet)

Pour  $x \in K_0$ , un n-lacet en x est un morphisme  $\alpha: \Delta^n \to K$  faisant commuter le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc} \partial\Delta^n & \longrightarrow & \Delta^0 \\ \downarrow & & \downarrow^x \\ \Delta^n & \longrightarrow & K \end{array}$$


#### Définition 1.1.11 (Homotopie

Deux n-lacets  $\alpha,\alpha'$  en x sont homotopes lorsqu'il existe une homotopie simpliciale  $\eta$  faisant commuter les diagrammes



#### Définition 1.1.11 (Homotopie

Deux n-lacets  $\alpha,\alpha'$  en x sont homotopes lorsqu'il existe une homotopie simpliciale  $\eta$  faisant commuter les diagrammes



#### Définition 1.1.11 (Groupe d'homotopie)

Le  $n^e$  groupe<sup>1</sup> d'homotopie d'un ensemble simplicial K en x est l'ensemble  $\pi_n(K,x)$  des classes d'équivalence de n-lacets sous la relation d'homotopie.

#### Définition 1.1.14 (Équivalence faible)

Un morphisme d'ensembles simpliciaux  $f:K\to L$  est une équivalence faible lorsqu'il induit des isomorphismes entre les ensembles de composantes connexes et entre chaque groupes d'homotopie.

#### Définition 1.1.14 (Équivalence faible)

Un morphisme d'ensembles simpliciaux  $f:K\to L$  est une équivalence faible lorsqu'il induit des isomorphismes entre les ensembles de composantes connexes et entre chaque groupes d'homotopie.

#### Définition 1.1.15 (Ensemble animé)

La catégorie des ensembles animés est la localisation de s**Set** aux équivalences faibles.

#### Définition 1.1.14 (Équivalence faible)

Un morphisme d'ensembles simpliciaux  $f:K\to L$  est une *équivalence faible* lorsqu'il induit des isomorphismes entre les ensembles de composantes connexes et entre chaque groupes d'homotopie.

#### Définition 1.1.15 (Ensemble animé)

La catégorie des ensembles animés est la localisation de sSet aux équivalences faibles.

On notera **Ani** cette ∞-catégorie.

#### Définition 1.2.1 (∞-Catégorie

Une  $\infty$ -catégorie est un ensemble simplicial  $\mathcal C$  tel que  $\mathcal C \to *$  est une fibration intérieure.

#### Définition 1.2.1 (∞-Catégorie)

Une  $\infty$ -catégorie est un ensemble simplicial  $\mathcal C$  tel que  $\mathcal C \to *$  est une fibration intérieure.

#### Remarque

De manière équivalente, une  $\infty$ -catégorie est un ensemble simplicial  $\mathcal C$  tel que la restriction

$$\mathsf{Hom}_{s\mathbf{Set}}(\Delta^2,\mathcal{C}) \to \mathsf{Hom}_{s\mathbf{Set}}(\Lambda^2_1,\mathcal{C})$$

est une fibration triviale.

#### Définition 1.2.2 (Foncteur

Un foncteur entre deux  $\infty$ -catégories est un morphisme d'ensembles simpliciaux.

#### Définition 1.2.2 (Foncteur)

Un foncteur entre deux ∞-catégories est un morphisme d'ensembles simpliciaux.

#### Définition 1.2.3 (Transformation naturelle)

Une *transformation naturelle* entre deux foncteurs  $F,G:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$  est un morphisme d'ensembles simpliciaux  $\eta:\mathcal{C}\times\Delta^1\to\mathcal{C}'$  tel que le diagramme suivant commute



Soit *K* un ensemble simplicial.

Les foncteurs  $K \to \mathcal{C}$  forment une  $\infty$ -catégorie, notée Fun $(K, \mathcal{C})$ .

 $\operatorname{Fun}(K,\mathcal{C})$  admet un complexe de Kan maximal, noté  $\operatorname{Fun}(K,\mathcal{C})^{\simeq}$ .

On note  $\textbf{Cat}_{\infty}$  l' $\infty\text{-catégorie}$  dont les objets sont les  $\infty\text{-catégories}$  et

$$\text{Hom}_{\text{Cat}_{\infty}}(\mathcal{C},\mathcal{C}') = \text{Fun}(\mathcal{C},\mathcal{C}')^{\simeq}$$

#### Définition 1.2.9 (Catégorie d'homotopie)

La catégorie d'homotopie h $\mathcal C$  d'une  $\infty$ -catégorie  $\mathcal C$  est l'image de  $\mathcal C$  par l'adjoint du foncteur de nerf.

#### Remarque

 $h\mathcal{C} \text{ a les mêmes objets que } \mathcal{C}\text{, mais } Hom_{h\mathcal{C}}(X,Y) = \pi_0 Hom_{\mathcal{C}}(X,Y).$ 

#### Définition 1.2.9 (Catégorie d'homotopie)

La catégorie d'homotopie h $\mathcal C$  d'une  $\infty$ -catégorie  $\mathcal C$  est l'image de  $\mathcal C$  par l'adjoint du foncteur de nerf.

#### Remarque

 $h\mathcal{C} \text{ a les mêmes objets que } \mathcal{C}\text{, mais } Hom_{h\mathcal{C}}(X,Y) = \pi_0 Hom_{\mathcal{C}}(X,Y).$ 

#### Définition 1.2.10 (Équivalence)

Un morphisme dans une  $\infty$ -catégorie  $\mathcal C$  est une *équivalence* lorsque son image dans h $\mathcal C$  est un isomorphisme.

#### Définition 1.2.12 (Catégorie des préfaisceaux

L'∞-catégorie des préfaisceaux d'animas sur une ∞-catégorie C est

$$\mathcal{P}(\mathcal{C}) := \operatorname{Fun}(\mathcal{C}^{\operatorname{op}}, \operatorname{\mathbf{Ani}})$$

#### Définition 1.2.12 (Catégorie des préfaisceaux)

L'∞-catégorie des préfaisceaux d'animas sur une ∞-catégorie C est

$$\mathcal{P}(\mathcal{C}) := Fun(\mathcal{C}^{op}, \textbf{Ani})$$

#### Lemme 1.2.13 (Lemme de Yoneda)

Pour une ∞-catégorie C, le plongement de Yoneda

$$\begin{array}{cccc} \mbox{$\sharp$} & : & \mbox{$\mathcal{C}$} & \rightarrow & \mbox{$\mathcal{P}(\mathcal{C})$} \\ & & \mbox{$X$} & \mapsto & \mbox{$[Y \mapsto \operatorname{Hom}(Y,X)]$} \end{array}$$

est pleinement fidèle.

#### Définition 1.2.12 (Catégorie des préfaisceaux)

L'∞-catégorie des préfaisceaux d'animas sur une ∞-catégorie C est

$$\mathcal{P}(\mathcal{C}) := \operatorname{Fun}(\mathcal{C}^{\operatorname{op}}, \operatorname{\mathbf{Ani}})$$

#### Lemme 1.2.13 (Lemme de Yoneda)

Pour une ∞-catégorie C, le plongement de Yoneda

$$\begin{array}{cccc} \mathcal{L} & : & \mathcal{C} & \rightarrow & \mathcal{P}(\mathcal{C}) \\ & X & \mapsto & [Y \mapsto \operatorname{Hom}(Y, X)] \end{array}$$

est pleinement fidèle.

#### Théorème 1.2.14 (Théorème de Yoneda)

Soient  $\mathcal C$  une  $\infty$ -catégorie et  $F:\mathcal C\to \mathbf{Ani}$  un foncteur. Alors le foncteur composé

$$\mathcal{C}^{op} \xrightarrow{\mbox{$\sharp$}} \mathcal{P}(\mathcal{C})^{op} \xrightarrow{Hom(-,F)} \textbf{Ani}$$

est équivalent à *F*.

#### Théorème 1.2.15 (Lissage-Délissage)

Soit  ${\mathcal S}$  une  $\infty\text{-cat\'egorie}.$  Il y a une \'equivalence d' $\infty\text{-cat\'egories}$ 

 $\mathsf{St}:\mathsf{cocart}(\mathcal{S}) \leftrightarrows \mathsf{Fun}(\mathcal{S},\textbf{Cat}_\infty):\mathsf{Un}$ 

∞-Catégories: Limites et colimites

# ∞-Catégories: Limites et colimites

#### Définition 1.2.16 (Limite)

Soit  $F:K\to\mathcal{C}$  un diagramme. Un objet  $Y\in\mathcal{C}$  est une *limite* de F lorsqu'il existe une transformation naturelle  $\underline{Y}_K\to F$  induisant, pour tout  $X\in\mathcal{C}$ , une équivalence d'animas

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y) \simeq \operatorname{Hom}_{\operatorname{Fun}(K,\mathcal{C})}(\underline{X}_K,F)$$

# ∞-Catégories: Limites et colimites

#### Définition 1.2.16 (Limite)

Soit  $F: K \to \mathcal{C}$  un diagramme. Un objet  $Y \in \mathcal{C}$  est une *limite* de F lorsqu'il existe une transformation naturelle  $\underline{Y}_K \to F$  induisant, pour tout  $X \in \mathcal{C}$ , une équivalence d'animas

$$\operatorname{\mathsf{Hom}}_{\mathcal{C}}(X,Y) \simeq \operatorname{\mathsf{Hom}}_{\operatorname{\mathsf{Fun}}(K,\mathcal{C})}(\underline{X}_K,F)$$

#### Définition 1.2.16 (Colimite)

Duallement, un objet  $X \in \mathcal{C}$  est une *colimite* de F lorsqu'il existe une transformation naturelle  $F \to \underline{X}_K$  induisant, pour tout  $Y \in \mathcal{C}$ , une équivalence d'animas

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y) \simeq \operatorname{Hom}_{\operatorname{Fun}(K,\mathcal{C})}(F,\underline{Y}_K)$$

### Définition 1.2.17 (Objet initial, final, nul)

Un objet est

final lorsqu'il est limite d'un diagramme vide;

### Définition 1.2.17 (Objet initial, final, nul)

### Un objet est

final lorsqu'il est limite d'un diagramme vide; initial lorsqu'il est colimite d'un diagramme vide;

### Définition 1.2.17 (Objet initial, final, nul)

### Un objet est

final lorsqu'il est limite d'un diagramme vide; initial lorsqu'il est colimite d'un diagramme vide; nul lorsqu'il est initial et final.

### Définition 1.2.17 (Objet initial, final, nul)

### Un objet est

final lorsqu'il est limite d'un diagramme vide; initial lorsqu'il est colimite d'un diagramme vide; nul lorsqu'il est initial et final.

### Définition 1.2.17 (Objet initial, final, nul)

Un objet est

final lorsqu'il est limite d'un diagramme vide; initial lorsqu'il est colimite d'un diagramme vide; nul lorsqu'il est initial et final.

Une ∞-catégorie est dite *pointée* lorsqu'elle admet un objet nul.

### Définition 1.2.17 (Objet initial, final, nul)

Un objet est

final lorsqu'il est limite d'un diagramme vide; initial lorsqu'il est colimite d'un diagramme vide; nul lorsqu'il est initial et final.

Une ∞-catégorie est dite *pointée* lorsqu'elle admet un objet nul.

On note Ø l'objet initial, \* l'objet final et 0 l'objet nul, lorsqu'ils existent.

### Définition 1.2.18 (Produit, co-produit)

Un *produit* est une limite d'un diagramme discret. Un *co-produit* est une colimite d'un diagramme discret.

### Définition 1.2.18 (Produit, co-produit)

Un *produit* est une limite d'un diagramme discret. Un *co-produit* est une colimite d'un diagramme discret.

On note 
$$X \times Y$$
 (ou  $\prod_{i \in I} X_i$ ) un produit et  $X + Y$  (ou  $\prod_{i \in I} X_i$ ) un co-produit.

### Définition 1.2.18 (Produit, co-produit)

Un *produit* est une limite d'un diagramme discret. Un *co-produit* est une colimite d'un diagramme discret.

On note 
$$X \times Y$$
 (ou  $\prod_{i \in I} X_i$ ) un produit et  $X + Y$  (ou  $\coprod_{i \in I} X_i$ ) un co-produit.

#### Définition 1.2.19 (Produit fibré, somme amalgamée)

Un *produit fibré* est une limite d'un diagramme de forme  $\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$ .

Une somme amalgamée est une colimite d'un diagramme de forme  $\bullet \leftarrow \bullet \rightarrow \bullet$ .

#### Définition 1.2.18 (Produit, co-produit)

Un *produit* est une limite d'un diagramme discret. Un *co-produit* est une colimite d'un diagramme discret.

On note 
$$X \times Y$$
 (ou  $\prod_{i \in I} X_i$ ) un produit et  $X + Y$  (ou  $\coprod_{i \in I} X_i$ ) un co-produit.

#### Définition 1.2.19 (Produit fibré, somme amalgamée)

Un *produit fibré* est une limite d'un diagramme de forme  $\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$ . Une *somme amalgamée* est une colimite d'un diagramme de forme  $\bullet \leftarrow \bullet \to \bullet$ .

On note  $X \underset{Z}{\times} Y$  un produit fibré et  $X \underset{Z}{+} Y$  une somme amalgamée.

#### Théorème 1.2.24

Une  $\infty$ -catégorie  $\mathcal C$  admet toutes les colimites finies si et seulement si elle admet toutes les sommes amalgamées et un objet initial.

#### Théorème 1.2.24

Une  $\infty$ -catégorie  $\mathcal C$  admet toutes les colimites finies si et seulement si elle admet toutes les sommes amalgamées et un objet initial.

#### Théorème 1.2.26

Soit *X* un objet d'une ∞-catégorie *C*. Alors le foncteur

$$Y \mapsto \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$$

préserve les limites qui existent dans  $\mathcal{C}.$ 

## ∞-Catégories: Adjonctions

### Définition 1.2.27 (Adjoint)

Un foncteur  $F:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$  entre  $\infty$ -catégories est *adjoint* à un foncteur  $G:\mathcal{C}'\to\mathcal{C}$  lorsqu'il existe une transformation naturelle  $\epsilon: \mathrm{id}_{\mathcal{C}'}\to G\circ F$  induisant, pour tout  $X\in\mathcal{C}$  et  $Y\in\mathcal{C}'$ , une équivalence d'animas

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}'}(FX,Y) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X,GY)$$

## ∞-Catégories: Adjonctions

### Définition 1.2.27 (Adjoint)

Un foncteur  $F:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$  entre  $\infty$ -catégories est *adjoint* à un foncteur  $G:\mathcal{C}'\to\mathcal{C}$  lorsqu'il existe une transformation naturelle  $\varepsilon:\mathrm{id}_{\mathcal{C}'}\to G\circ F$  induisant, pour tout  $X\in\mathcal{C}$  et  $Y\in\mathcal{C}'$ , une équivalence d'animas

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}'}(FX,Y) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X,GY)$$

#### Proposition 1.2.29

Soient  $F:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$  un foncteur admettant un co-adjoint G. Alors F préserve toutes les colimites.

## ∞-Catégories: Adjonctions

#### Définition 1.2.27 (Adjoint)

Un foncteur  $F:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$  entre  $\infty$ -catégories est *adjoint* à un foncteur  $G:\mathcal{C}'\to\mathcal{C}$  lorsqu'il existe une transformation naturelle  $\epsilon: \mathrm{id}_{\mathcal{C}'}\to G\circ F$  induisant, pour tout  $X\in\mathcal{C}$  et  $Y\in\mathcal{C}'$ , une équivalence d'animas

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}'}(FX,Y) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X,GY)$$

#### Proposition 1.2.29

Soient  $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$  un foncteur admettant un co-adjoint G. Alors F préserve toutes les colimites.

Duallement, *G* préserve toutes les limites.



#### Définition 1.2.31 (Ensemble simplicial filtré

Un ensemble simplicial *K* est *filtré* lorsque toute colimite de forme *K* dans **Ani** existe et commute avec toutes les limites finies.

#### Définition 1.2.31 (Ensemble simplicial filtré)

Un ensemble simplicial *K* est *filtré* lorsque toute colimite de forme *K* dans **Ani** existe et commute avec toutes les limites finies.

#### Définition 1.2.32

Soit  $\mathcal C$  une petite  $\infty$ -catégorie. Ind $(\mathcal C)$  est l' $\infty$ -catégorie ayant pour objets les petits diagrammes filtrés  $X:D_X\to \mathcal C$  et comme animas de morphismes

$$\operatorname{Hom}_{\operatorname{Ind}(\mathcal{C})}(X,Y) = \lim_{d \in D_X} \operatornamewithlimits{colim}_{d' \in D_Y} \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X(d),Y(d'))$$

#### Définition 1.2.33 (∞-Catégorie accessible

Une  $\infty$ -catégorie est *accessible* lorsqu'il existe une petite  $\infty$ -catégorie  $\mathcal{C}'$  telle que

$$\mathcal{C} \simeq Ind(\mathcal{C}')$$

#### Définition 1.2.33 (∞-Catégorie accessible

Une  $\infty$ -catégorie est *accessible* lorsqu'il existe une petite  $\infty$ -catégorie  $\mathcal{C}'$  telle que

$$\mathcal{C} \simeq Ind(\mathcal{C}')$$

### Définition 1.2.34 (∞-Catégorie présentable)

Une  $\infty$ -catégorie est *présentable* lorsqu'elle est accessible et qu'elle admet toutes les petites colimites.

#### Définition 1.2.33 (∞-Catégorie accessible

Une  $\infty$ -catégorie est *accessible* lorsqu'il existe une petite  $\infty$ -catégorie  $\mathcal{C}'$  telle que

$$\mathcal{C} \simeq Ind(\mathcal{C}')$$

### Définition 1.2.34 (∞-Catégorie présentable)

Une  $\infty$ -catégorie est *présentable* lorsqu'elle est accessible et qu'elle admet toutes les petites colimites.

#### Proposition 1.2.35

Une  $\infty$ -catégorie est présentable si et seulement si elle est localement petite et qu'elle est engendrée par petites colimites d'un petit ensemble d'objets.

On note  $\operatorname{Fin}_*$  la catégorie des ensembles finis  $\langle n \rangle = \{1,\ldots,n\}$  et des applications partielles, et  $\rho_i^n:\langle n \rangle \rightharpoonup \langle 1 \rangle$  l'unique morphisme défini uniquement en i.

On note  $\operatorname{Fin}_*$  la catégorie des ensembles finis  $\langle n \rangle = \{1, \dots, n\}$  et des applications partielles, et  $\rho_i^n : \langle n \rangle \rightharpoonup \langle 1 \rangle$  l'unique morphisme défini uniquement en i.

#### Définition 1.3.1 (∞-Catégorie monoïdale symétrique)

Soit  $\mathcal C$  une  $\infty$ -catégorie. Une structure mono"idale sym'etrique sur  $\mathcal C$  est une fibration co-cartésienne

$$\mathcal{C}^{\otimes} \to \Delta^{\textbf{Fin}_*}$$

telle que  $\mathcal{C}\simeq\mathcal{C}_{\langle 1\rangle}^\otimes$  et les morphismes  $\rho_i^n$  induisent des foncteurs  $\mathcal{C}_{\langle n\rangle}^\otimes\to\mathcal{C}$  qui déterminent une équivalence

$$\mathcal{C}_{\langle n \rangle}^{\otimes} \simeq \mathcal{C}^n$$

On note  $\operatorname{Fin}_*$  la catégorie des ensembles finis  $\langle n \rangle = \{1,\ldots,n\}$  et des applications partielles, et  $\rho_i^n:\langle n \rangle \rightharpoonup \langle 1 \rangle$  l'unique morphisme défini uniquement en i.

#### Définition 1.3.1 (∞-Catégorie monoïdale symétrique

Soit  $\mathcal C$  une  $\infty$ -catégorie. Une structure mono"idale sym'etrique sur  $\mathcal C$  est une fibration co-cartésienne

$$\mathcal{C}^{\otimes} \to \Delta^{\textbf{Fin}_*}$$

telle que  $\mathcal{C}\simeq\mathcal{C}_{\langle 1\rangle}^\otimes$  et les morphismes  $\rho_i^n$  induisent des foncteurs  $\mathcal{C}_{\langle n\rangle}^\otimes\to\mathcal{C}$  qui déterminent une équivalence

$$\mathcal{C}_{\langle n \rangle}^{\otimes} \simeq \mathcal{C}^n$$

### Remarque

Par le théorème de Lissage-Délissage, une structure monoïdale symétrique sur  $\mathcal C$  peut se comprendre comme un foncteur  $\Delta^{\operatorname{Fin}_*} \to \operatorname{Cat}_\infty$  par lequel  $\langle 1 \rangle$  a pour image  $\mathcal C$ .

### Définition 1.3.4 (∞-Catégorie monoïdale symétrique fermée)

Une ∞-catégorie monoïdale symétrique C est dite *fermée* lorsque, pour tout objet  $Y \in C$ , le foncteur  $- \otimes Y$  admet un co-adjoint  $\mathcal{H}om(Y, -)$ .

### Définition 1.3.4 (∞-Catégorie monoïdale symétrique fermée)

Une  $\infty$ -catégorie monoïdale symétrique  $\mathcal C$  est dite *fermée* lorsque, pour tout objet  $Y \in \mathcal C$ , le foncteur  $-\otimes Y$  admet un co-adjoint  $\mathcal Hom(Y,-)$ .

#### Définition (Structure monoïdale symétrique cartésienne)

Une structure monoïdale symétrique sur une  $\infty$ -catégorie  $\mathcal C$  est dite *cartésienne* lorsque  $\mathbf 1_{\mathcal C}$  est final et que, pour deux objets X et Y de  $\mathcal C$ ,  $X\otimes Y\simeq X\times Y$ .

### Définition 1.3.4 (∞-Catégorie monoïdale symétrique fermée)

Une  $\infty$ -catégorie monoïdale symétrique  $\mathcal C$  est dite *fermée* lorsque, pour tout objet  $Y \in \mathcal C$ , le foncteur  $-\otimes Y$  admet un co-adjoint  $\mathcal Hom(Y,-)$ .

#### Définition (Structure monoïdale symétrique cartésienne)

Une structure monoïdale symétrique sur une  $\infty$ -catégorie  $\mathcal C$  est dite *cartésienne* lorsque  $\mathbf 1_{\mathcal C}$  est final et que, pour deux objets X et Y de  $\mathcal C$ ,  $X\otimes Y\simeq X\times Y$ .

#### Remarque

Une telle structure est essentiellement unique.

### Définition 1.3.3 (Foncteur monoïdal symétrique)

Soient  $\mathcal C$  et  $\mathcal C'$  deux  $\infty$ -catégories admettant des structures monoïdales symétriques, définies par des fibrations

$$\mathcal{C}^{\otimes},\mathcal{C}'^{\otimes} \to \Delta^{Fin_*}$$

Un foncteur monoïdal symétrique (faible) est un foncteur  $\mathcal{C}^{\otimes} \to \mathcal{C}'^{\otimes}$  au-dessus de  $\mathbf{Fin}_*$  préservant les relèvements co-cartésiens des  $\rho_i^n$ .

### Définition 1.3.3 (Foncteur monoïdal symétrique)

Soient  $\mathcal C$  et  $\mathcal C'$  deux  $\infty$ -catégories admettant des structures monoïdales symétriques, définies par des fibrations

$$\mathcal{C}^{\otimes}$$
,  $\mathcal{C}'^{\otimes} \to \Delta^{\text{Fin}_*}$ 

Un foncteur monoïdal symétrique (faible) est un foncteur  $\mathcal{C}^{\otimes} \to \mathcal{C}'^{\otimes}$  au-dessus de  $\mathbf{Fin}_*$  préservant les relèvements co-cartésiens des  $\rho_i^n$ .

#### Définition 1.3.3 (Foncteur monoïdal symétrique fort)

Un foncteur monoïdal symétrique est dit *fort* lorsqu'il préserve tous les relèvements co-cartésiens.

### Stabilité

#### Définition 1.4.1 (Triangle

Soit  $\mathcal C$  une  $\infty$ -catégorie pointée. Un triangle de  $\mathcal C$  est un diagramme commutatif



### Stabilité

#### Définition 1.4.1 (Triangle

Soit  $\mathcal C$  une  $\infty$ -catégorie pointée. Un *triangle* de  $\mathcal C$  est un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & Z \end{array}$$

On note plus souvent  $X \to Y \to Z$  un triangle.

Parenthèse: diagramme "commutatif"

$$\begin{array}{ccc}
X & \longrightarrow & Y \\
\downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & Z
\end{array}$$

Parenthèse: diagramme "commutatif"



Parenthèse: diagramme "commutatif"



### Stabilité

#### Définition 1.4.1 (Triangle)

Soit  $\mathcal{C}$  une  $\infty$ -catégorie pointée. Un *triangle* de  $\mathcal{C}$  est un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & Z \end{array}$$

On note plus souvent  $X \to Y \to Z$  un triangle.

27

### Stabilité

#### Définition 1.4.1 (Triangle)

Soit  $\mathcal C$  une  $\infty$ -catégorie pointée. Un *triangle* de  $\mathcal C$  est un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & Z \end{array}$$

On note plus souvent  $X \to Y \to Z$  un triangle.

### Définition 1.4.2 (Suite fibrée, co-fibrée)

Un triangle  $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$  est une *suite* fibrée lorsque c'est un produit fibré;

co-fibrée lorsque c'est une somme amalgamée.

On dit alors que X est la *fibre* de g, et que Z est la *co-fibre* de f.

27

#### Définition 1.4.1 (Triangle)

Soit  $\mathcal{C}$  une  $\infty$ -catégorie pointée. Un *triangle* de  $\mathcal{C}$  est un diagramme commutatif



On note plus souvent  $X \to Y \to Z$  un triangle.

### Définition 1.4.2 (Suite fibrée, co-fibrée)

Un triangle  $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$  est une *suite* fibrée lorsque c'est un produit fibré;

co-fibrée lorsque c'est une somme amalgamée.

On dit alors que X est la *fibre* de *g*, et que Z est la *co-fibre* de *f* .

On note fib(g) la fibre d'un morphisme, et cofib(f) sa co-fibre.

27

#### Définition 1.4.3 (∞-Catégorie stable)

Une ∞-catégorie pointée est stable lorsque

- Tout morphisme admet une fibre et une co-fibre;
- Un triangle est une suite fibrée si et seulement si c'est une suite co-fibrée.

#### Définition 1.4.3 (∞-Catégorie stable)

Une ∞-catégorie pointée est stable lorsque

- Tout morphisme admet une fibre et une co-fibre;
- Un triangle est une suite fibrée si et seulement si c'est une suite co-fibrée.

#### Remarque

La stabilité est une propriété auto-duale.

#### Définition 1.4.3 (∞-Catégorie stable)

Une ∞-catégorie pointée est stable lorsque

- Tout morphisme admet une fibre et une co-fibre;
- Un triangle est une suite fibrée si et seulement si c'est une suite co-fibrée.

#### Remarque

La stabilité est une propriété auto-duale.

#### Proposition 1.4.4

Une ∞-catégorie pointée C est stable si et seulement si

- Elle admet toutes les limites et colimites finies;
- Un carré est un produit fibré si et seulement si c'est une somme amalgamée.

## Théorème 1.4.11 (Correspondance de Dold-Kan)

Le foncteur

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{s}\mathbf{A}\mathbf{b} & \to & \mathrm{Ch}_+(\mathbf{A}\mathbf{b}) \\ A_{\bullet} & \mapsto & \left(\bigcap_{i=0}^{n-1} \ker(d_i)\right)_n \end{array}$$

induit une équivalence de catégories.

### Théorème 1.4.11 (Correspondance de Dold-Kan)

Le foncteur

$$sAb \rightarrow Ch_{+}(Ab)$$

$$A_{\bullet} \mapsto \left(\bigcap_{i=0}^{n-1} \ker(d_{i})\right)_{n}$$

induit une équivalence de catégories.

Soit A une catégorie abélienne. En notant, pour A et B dans  $Ch_+(A)$ ,

$$\operatorname{Hom}(A,B)_n = \prod_i \operatorname{Hom}_{\operatorname{Ch}_+(A)}(A_i,B_{i+n})$$

on fait de  $\text{Ch}_+(\mathcal{A})$  une catégorie enrichie en complexes de groupes abéliens.

#### Définition 1.4.12 (∞-Catégorie dérivée

Soit  $\mathcal A$  une catégorie abélienne avec assez de projectifs. L' $\infty$ -catégorie dérivée  $\mathcal D(\mathcal A)$  de  $\mathcal A$  est

$$\mathcal{D}(\mathcal{A}) = N(Ch_+(\mathcal{A}_{proj}))$$

### Définition 1.4.12 (∞-Catégorie dérivée)

Soit  $\mathcal A$  une catégorie abélienne avec assez de projectifs. L' $\infty$ -catégorie dérivée  $\mathcal D(\mathcal A)$  de  $\mathcal A$  est

$$\mathcal{D}(\mathcal{A}) = N(Ch_+(\mathcal{A}_{proj}))$$

### Proposition 1.4.13

L'∞-catégorie dérivée d'une catégorie abélienne est stable.

Formalismes à six foncteurs abstraits

#### Définition 2.1.1 (Contexte géométrique)

Un contexte géométrique est la donnée d'une  $\infty$ -catégorie  $\mathcal C$  et d'une classe de morphismes E de  $\mathcal C$  tels que


- C admet toutes les limites finies;
- E contient toutes les équivalences et est stable par composition et changement de base.

Pour  $n \geq 0$ , on note  $(\Delta^n)_+^2$  le sous-ensemble simplicial de  $(\Delta^n)^{\mathrm{op}} \times \Delta^n$  engendré par

$$\left\{(i,j)\in \llbracket 0,n\rrbracket^2\mid i\geq j\right\}$$

Pour  $n \geq 0$ , on note  $(\Delta^n)_+^2$  le sous-ensemble simplicial de  $(\Delta^n)^{\mathrm{op}} \times \Delta^n$  engendré par


$$\left\{(i,j)\in [0,n]^2\mid i\geq j\right\}$$



## Définition 2.1.2 (Correspondance)

Soit (C, E) un contexte géométrique. L'ensemble simplicial des *correspondances* Corr(C, E) a pour *n*-simplexes les morphismes d'ensembles simpliciaux  $(\Delta^n)_+^2 \to C$  tels que

- Tout morphisme induit par  $(i,j) \rightarrow (i,j+k)$ , avec  $k \in [0,i-j]$  est dans E;
- Tout carré induit par




est cartésien.


## Définition 2.1.2 (Correspondance)

Soit (C, E) un contexte géométrique. L'ensemble simplicial des *correspondances* Corr(C, E) a pour *n*-simplexes les morphismes d'ensembles simpliciaux  $(\Delta^n)_+^2 \to C$  tels que

- Tout morphisme induit par  $(i,j) \rightarrow (i,j+k)$ , avec  $k \in [0,i-j]$  est dans E;
- Tout carré induit par



est cartésien.



#### Définition 2.2.1 (Formalisme à trois foncteurs)

Un formalisme à trois foncteurs sur  $\mathcal C$  est un foncteur monoïdal symétrique

$$\mathcal{D}: Corr(\mathcal{C}, E) \to cMon(\mathbf{Cat}_{\infty})$$

#### Définition 2.2.1 (Formalisme à trois foncteurs)

Un formalisme à trois foncteurs sur  $\mathcal C$  est un foncteur monoïdal symétrique

$$\mathcal{D}: Corr(\mathcal{C}, E) \to cMon(\mathbf{Cat}_{\infty})$$

$$X \mapsto \mathcal{D}(X)$$

#### Définition 2.2.1 (Formalisme à trois foncteurs)

Un formalisme à trois foncteurs sur  $\mathcal C$  est un foncteur monoïdal symétrique

$$\mathcal{D}: Corr(\mathcal{C}, E) \to cMon(\mathbf{Cat}_{\infty})$$

$$X \mapsto \mathcal{D}(X) \\ - \otimes -$$

#### Définition 2.2.1 (Formalisme à trois foncteurs)

Un formalisme à trois foncteurs sur C est un foncteur monoïdal symétrique

$$\mathcal{D}: \operatorname{Corr}(\mathcal{C}, E) \to \operatorname{cMon}(\mathbf{Cat}_{\infty})$$

#### Définition 2.2.1 (Formalisme à trois foncteurs)

Un formalisme à trois foncteurs sur C est un foncteur monoïdal symétrique

$$\mathcal{D}: Corr(\mathcal{C}, E) \to cMon(\textbf{Cat}_{\infty})$$

$$X \qquad \mapsto \qquad \mathcal{D}(X) \\ - \otimes -$$

$$X \qquad \mapsto \qquad f^* : \mathcal{D}(Y) \to \mathcal{D}(X)$$

$$X \qquad \qquad Y \qquad \mapsto \qquad f_! : \mathcal{D}(X) \to \mathcal{D}(Y)$$

$$X \qquad \qquad Y \qquad \mapsto \qquad f_! : \mathcal{D}(X) \to \mathcal{D}(Y)$$

#### Définition 2.2.1 (Formalisme à trois foncteurs)

Un formalisme à trois foncteurs sur  $\mathcal C$  est un foncteur monoïdal symétrique

$$\mathcal{D}: \operatorname{Corr}(\mathcal{C}, E) \to \operatorname{cMon}(\mathbf{Cat}_{\infty})$$

$$X \qquad \mapsto \qquad \mathcal{D}(X) \\ - \otimes -$$

$$X \qquad \mapsto \qquad f^* : \mathcal{D}(Y) \to \mathcal{D}(X)$$

$$X \qquad \mapsto \qquad f_! : \mathcal{D}(X) \to \mathcal{D}(Y)$$

$$X \qquad \qquad Y$$

#### Définition 2.2.2 (Formalisme à six foncteurs)

Soit  $(\mathcal{C}, E)$  un contexte géométrique. Un *formalisme* à six *foncteurs* sur  $\mathcal{C}$  est un formalisme à trois foncteurs  $\mathcal{D}$  tel que les  $\infty$ -catégories monoïdales symétriques  $\mathcal{D}(X)$  sont toujours fermées et les foncteurs  $f^*$  et  $f_!$  admettent toujours des co-adjoints.

Soit  $\mathcal{D}: Corr(\mathcal{C}, E) \to cMon(\textbf{Cat}_{\infty})$  un formalisme à trois foncteurs.

Soit  $\mathcal{D}: Corr(\mathcal{C}, E) \to cMon(\textbf{Cat}_{\infty})$  un formalisme à trois foncteurs.

## Proposition 2.2.3 (Changement de base)

Pour tout carré cartésien de  ${\cal C}$ 

$$X' \xrightarrow{g'} X$$

$$f' \downarrow \qquad \qquad \downarrow f$$

$$Y' \xrightarrow{g} Y$$

 $\operatorname{avec} f \in E$ , on a une équivalence

$$g^*f_! \simeq f_!'g'^*$$

de foncteurs  $\mathcal{D}(X) \to \mathcal{D}(Y')$ .

Soit  $\mathcal{D}: Corr(\mathcal{C}, E) \to cMon(\textbf{Cat}_{\infty})$  un formalisme à trois foncteurs.

#### Proposition 2.2.3 (Changement de base)

Pour tout carré cartésien de  $\mathcal C$ 

$$\begin{array}{ccc} X' & \stackrel{g'}{\longrightarrow} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \stackrel{g}{\longrightarrow} & Y \end{array}$$

 $avec f \in E$ , on a une équivalence

$$g^*f_! \simeq f_!'g'^*$$

de foncteurs  $\mathcal{D}(X) \to \mathcal{D}(Y')$ .

## Proposition 2.2.4 (Formule de projection)

Soient  $f: X \to Y$  un morphisme de  $E, A \in \mathcal{D}(X)$  et  $B \in \mathcal{D}(Y)$ . Alors

$$f_!(A) \otimes B \simeq f_!(A \otimes f^*B)$$

# Construire un contexte géométrique

## Définition 2.3.1 (Décomposition de Grothendieck-Wirthmüller)

Une décomposition de Grothendieck-Wirthmüller de E est une paire de parties (I,P) de E telle que

- Tout morphisme  $f \in E$  peut s'écrire  $f \simeq i \circ p$  avec  $i \in I$  et  $p \in P$ .
- Tout morphisme  $f \in I \cap P$  est n-tronqué pour  $n \ge -2$ .
- *I* et *P* sont stables par changement de base et contiennent les identités.
- Pour  $f \in I$  (resp. P),  $f \circ g \in I$  (resp. P) si et seulement si  $g \in I$  (resp. P).

# Dualités: hypothèses

On fixe donc pour cette section un formalisme à six foncteurs

$$\mathcal{D}: Corr(\mathcal{C}, E) \to cMon(\textbf{Cat}_{\infty})$$

et un morphisme  $f:X \to Y$  dans E. On note  $\Delta_f:X \to X \underset{Y}{\times} X$  la diagonale.

# Dualités: hypothèses

On fixe donc pour cette section un formalisme à six foncteurs

$$\mathcal{D}: \operatorname{Corr}(\mathcal{C}, E) \to \operatorname{cMon}(\mathbf{Cat}_{\infty})$$

et un morphisme  $f:X \to Y$  dans E. On note  $\Delta_f:X \to X \underset{Y}{\times} X$  la diagonale.

• En remplacant C par  $C_{/Y}$ , on peut supposer que Y est final;

## Dualités: hypothèses

On fixe donc pour cette section un formalisme à six foncteurs

$$\mathcal{D}: \operatorname{Corr}(\mathcal{C}, E) \to \operatorname{cMon}(\mathbf{Cat}_{\infty})$$

et un morphisme  $f:X \to Y$  dans E. On note  $\Delta_f:X \to X \underset{Y}{\times} X$  la diagonale.

- En remplacant C par  $C_{/Y}$ , on peut supposer que Y est final;
- En ne gardant dans  $\mathcal{C}_{/Y}$  que les objets X tels que  $X \to Y$  est dans E, et en ne considérant que les Y-morphismes qui sont dans E, on peut supposer que tout morphisme de  $\mathcal{C}$  est dans E.

## Dualités: Foncteurs de Fourier-Mukai

#### Définition 2.4.1 (Foncteur de Fourier-Mukai)

Soient X et X' deux objets de  $\mathcal C$  et  $K\in \mathcal D(X\times X')$ . Le foncteur de Fourier-Mukai de noyau K est

$$\begin{array}{cccc} \operatorname{FM}_K & : & \mathcal{D}(X) & \to & \mathcal{D}(X') \\ & A & \mapsto & \operatorname{pr}_{2!}(K \otimes \operatorname{pr}_1^*A) \end{array}$$

## Dualités: Foncteurs de Fourier-Mukai

#### Définition 2.4.1 (Foncteur de Fourier-Mukai)

Soient X et X' deux objets de  $\mathcal C$  et  $K\in\mathcal D(X\times X')$ . Le foncteur de Fourier-Mukai de noyau K est

$$\begin{array}{cccc} FM_K & : & \mathcal{D}(X) & \to & \mathcal{D}(X') \\ & A & \mapsto & pr_{2!}(K \otimes pr_1^*A) \end{array}$$

#### Remarque

Le composé de foncteurs de Fourier-Mukai est un foncteur de Fourier-Mukai.

## Définition 2.4.2 (2-catégorie de Lu-Zheng)

La 2-catégorie de Lu-Zheng d'un formalisme à six foncteurs  $\mathcal D$  a pour objets les objets de  $\mathcal C$  et pour catégorie de morphismes  $\operatorname{Hom}_{LZ_{\mathcal D}}(X,X')=\operatorname{h}\mathcal D(X\times X').$ 

## Définition 2.4.2 (2-catégorie de Lu-Zheng)

La 2-catégorie de Lu-Zheng d'un formalisme à six foncteurs  $\mathcal D$  a pour objets les objets de  $\mathcal C$  et pour catégorie de morphismes  $\operatorname{Hom}_{LZ_{\mathcal D}}(X,X')=\operatorname{h}\mathcal D(X\times X').$ 

• L'identité d'un objet X dans cette 2-catégorie est  $\mathrm{id}_X = \Delta_! \mathbf{1}_X$ .

## Définition 2.4.2 (2-catégorie de Lu-Zheng)

La 2-catégorie de Lu-Zheng d'un formalisme à six foncteurs  $\mathcal D$  a pour objets les objets de  $\mathcal C$  et pour catégorie de morphismes  $\operatorname{Hom}_{\mathsf{LZ}_{\mathcal D}}(X,X')=\operatorname{h}\mathcal D(X\times X').$ 

- L'identité d'un objet X dans cette 2-catégorie est  $id_X = \Delta_! \mathbf{1}_X$ .
- La composition dans  $LZ_{\mathcal{D}}$  est donnée par la convolution des noyaux:

$$\begin{array}{cccc} \operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(X,X') \times \operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(X',X'') & \to & \operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(X,X'') \\ A,B & \mapsto & A \star B = \operatorname{pr}_{X,X''!}(\operatorname{pr}_{X,X'}^*(A) \otimes \operatorname{pr}_{X',X''}^*(B)) \end{array}$$

## Définition 2.4.2 (2-catégorie de Lu-Zheng)

La 2-catégorie de Lu-Zheng d'un formalisme à six foncteurs  $\mathcal D$  a pour objets les objets de  $\mathcal C$  et pour catégorie de morphismes  $\operatorname{Hom}_{\mathsf{LZ}_{\mathcal D}}(X,X')=\operatorname{h}\mathcal D(X\times X').$ 

- L'identité d'un objet X dans cette 2-catégorie est  $id_X = \Delta_! \mathbf{1}_X$ .
- La composition dans  $LZ_{\mathcal{D}}$  est donnée par la convolution des noyaux:

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(X,X') \times \operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(X',X'') & \to & \operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(X,X'') \\ A,B & \mapsto & A \star B = \operatorname{pr}_{X,X''!}(\operatorname{pr}_{X,X'}^*(A) \otimes \operatorname{pr}_{X',X''}^*(B)) \end{array}$$

• Cette 2-catégorie est auto-duale:  $LZ_{\mathcal{D}}^{op} \simeq LZ_{\mathcal{D}}$ .

## Définition 2.4.2 (2-catégorie de Lu-Zheng)

La 2-catégorie de Lu-Zheng d'un formalisme à six foncteurs  $\mathcal D$  a pour objets les objets de  $\mathcal C$  et pour catégorie de morphismes  $\operatorname{Hom}_{\mathsf{LZ}_{\mathcal D}}(X,X')=\operatorname{h}\mathcal D(X\times X').$ 

- L'identité d'un objet X dans cette 2-catégorie est  $id_X = \Delta_! \mathbf{1}_X$ .
- La composition dans  $LZ_{\mathcal{D}}$  est donnée par la convolution des noyaux:

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(X,X') \times \operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(X',X'') & \to & \operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(X,X'') \\ A,B & \mapsto & A \star B = \operatorname{pr}_{X,X''!}(\operatorname{pr}_{X,X'}^*(A) \otimes \operatorname{pr}_{X',X''}^*(B)) \end{array}$$

• Cette 2-catégorie est auto-duale:  $LZ_{\mathcal{D}}^{op} \simeq LZ_{\mathcal{D}}$ .

$$\begin{array}{cccc} LZ_{\mathcal{D}} & \to & \textbf{Cat} \\ X & \mapsto & h\mathcal{D}(X) \\ K \in h\mathcal{D}(X \times X') & \mapsto & FM_K \end{array}$$

## Dualités: Poincaré

## Définition 2.4.4 (Dualisant)

Le dualisant de f est

$$\omega_f = f!(\mathbf{1}_Y)$$

#### Définition 2.4.4 (Dualisant)

Le dualisant de f est

$$\omega_f = f!(\mathbf{1}_Y)$$

#### Définition 2.4.5 (Morphisme cohomologiquement lisse)

Le morphisme f est cohomologiquement lisse lorsque

- (i). Le morphisme  $\omega_f \otimes f^*(-) \to f^!(-)$  est une équivalence;
- (ii). Le dualisant de f est  $\otimes$ -inversible;
- (iii). Pour tout carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

Le morphisme f' vérifie les conditions (i) et (ii) et le morphisme  $g'^*\omega_f\to\omega_{f'}$  est une équivalence.

# Dualités: Poincaré

#### Théorème 2.4.6

f est cohomologiquement lisse si et seulement s'il existe un objet  $\otimes\text{-inversible }L\in\mathcal{D}(X)$  et des morphismes

$$\alpha:\Delta_{f!}\mathbf{1}_X\to\operatorname{pr}_2^*L$$

et

$$\beta: f_!L \to \mathbf{1}_X$$

tels que les composés

$$\mathbf{1}_{X} \simeq \operatorname{pr}_{1!} \Delta_{f!} \mathbf{1}_{X} \xrightarrow{\alpha} \operatorname{pr}_{1!} \operatorname{pr}_{2}^{*} L \simeq f^{*} f_{!} L \xrightarrow{\beta} \mathbf{1}_{X}$$

et

$$L \simeq \operatorname{pr}_{2!}(\operatorname{pr}_1^*(L) \otimes \Delta_{f!}(\mathbf{1}_X)) \xrightarrow{\alpha} \operatorname{pr}_{2!}(\operatorname{pr}_1^*(L) \otimes \operatorname{pr}_2^*(L)) \simeq \operatorname{pr}_{2!} \operatorname{pr}_1^*(L) \otimes L \simeq f^*f_!(L) \otimes L \xrightarrow{\beta} L$$
 sont équivalents à l'identité.

#### Définition 2.4.7 (Objet f-lisse

Un objet  $A \in \mathcal{D}(X)$  est *f-lisse* lorsque, vu dans  $\operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(X,Y)$ , c'est un adjoint.

#### Définition 2.4.7 (Objet f-lisse)

Un objet  $A \in \mathcal{D}(X)$  est f-lisse lorsque, vu dans  $\operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(X,Y)$ , c'est un adjoint.

## Définition 2.4.7 (Objet f-propre)

Un objet  $A \in \mathcal{D}(X)$  est f-propre lorsque, vu dans  $\operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(Y,X)$ , c'est un adjoint.

#### Définition 2.4.7 (Objet f-lisse)

Un objet  $A \in \mathcal{D}(X)$  est *f-lisse* lorsque, vu dans  $\operatorname{Hom}_{LZ_{\mathcal{D}}}(X,Y)$ , c'est un adjoint.

$$\begin{split} B &\in \mathcal{D}(X) = \operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(Y, X) \\ \alpha &: \Delta_{f!}(\mathbf{1}_X) \to \operatorname{pr}_1^*(A) \otimes \operatorname{pr}_2^*(B) \\ \beta &: f_!(A \otimes B) \to \mathbf{1}_Y \end{split}$$

#### Définition 2.4.7 (Objet *f*-propre)

Un objet  $A \in \mathcal{D}(X)$  est f-propre lorsque, vu dans  $\operatorname{Hom}_{\mathsf{LZ}_{\mathcal{D}}}(Y,X)$ , c'est un adjoint.

#### Définition 2.4.7 (Objet *f*-lisse)

Un objet  $A \in \mathcal{D}(X)$  est f-lisse lorsque, vu dans  $\operatorname{Hom}_{\mathsf{LZ}_{\mathcal{D}}}(X,Y)$ , c'est un adjoint.

$$\begin{split} B &\in \mathcal{D}(X) = \operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(Y, X) \\ \alpha &: \Delta_{f!}(\mathbf{1}_X) \to \operatorname{pr}_1^*(A) \otimes \operatorname{pr}_2^*(B) \\ \beta &: f_!(A \otimes B) \to \mathbf{1}_Y \end{split}$$

#### Définition 2.4.7 (Objet *f*-propre)

Un objet  $A \in \mathcal{D}(X)$  est *f-propre* lorsque, vu dans  $\operatorname{Hom}_{LZ_{\mathcal{D}}}(Y,X)$ , c'est un adjoint.

$$B \in \mathcal{D}(X) = \operatorname{Hom}_{\operatorname{LZ}_{\mathcal{D}}}(X, Y)$$
  

$$\alpha : \operatorname{pr}_{1}^{*}(A) \otimes \operatorname{pr}_{2}^{*}(B) \to \Delta_{f!}(\mathbf{1}_{X})$$
  

$$\beta : \mathbf{1}_{Y} \to f_{!}(A \otimes B)$$

# Définition 2.4.8 (Dual de Verdier)

Le dual de verdier d'un objet f-lisse  $A \in \mathcal{D}(X)$  est

$$\mathbb{D}_f(A) = \mathcal{H}om(A, f^!(\mathbf{1}_Y))$$

# Définition 2.4.8 (Dual de Verdier)

Le *dual de verdier* d'un objet f-lisse  $A \in \mathcal{D}(X)$  est

$$\mathbb{D}_f(A) = \mathcal{H}om(A, f^!(\mathbf{1}_Y))$$

# Proposition 2.4.7

Soit  $A \in \mathcal{D}(X)$  un objet f-lisse, de co-adjoint  $B \in \mathcal{D}(X)$ .

1. B est f-lisse, de co-adjoint A.

## Définition 2.4.8 (Dual de Verdier)

Le *dual de verdier* d'un objet f-lisse  $A \in \mathcal{D}(X)$  est

$$\mathbb{D}_f(A) = \mathcal{H}om(A, f^!(\mathbf{1}_Y))$$

# Proposition 2.4.7

Soit  $A \in \mathcal{D}(X)$  un objet f-lisse, de co-adjoint  $B \in \mathcal{D}(X)$ .

- 1. *B* est *f*-lisse, de co-adjoint *A*.
- 2. Il y a une équivalence de foncteurs

$$B \otimes f^*(-) \simeq \mathcal{H}om(A, f^!(-)) : \mathcal{D}(Y) \to \mathcal{D}(X)$$

# Définition 2.4.8 (Dual de Verdier)

Le *dual de verdier* d'un objet f-lisse  $A \in \mathcal{D}(X)$  est

$$\mathbb{D}_f(A) = \mathcal{H}om(A, f^!(\mathbf{1}_Y))$$

## Proposition 2.4.7

Soit  $A \in \mathcal{D}(X)$  un objet f-lisse, de co-adjoint  $B \in \mathcal{D}(X)$ .

- 1. *B* est *f*-lisse, de co-adjoint *A*.
- 2. Il y a une équivalence de foncteurs

$$B \otimes f^*(-) \simeq \mathcal{H}om(A, f^!(-)) : \mathcal{D}(Y) \to \mathcal{D}(X)$$

3. Le morphisme naturel

$$A \to \mathbb{D}_f(\mathbb{D}_f(A))$$

est une équivalence.

# Définition 2.4.8 (Dual de Verdier)

Le *dual de verdier* d'un objet f-lisse  $A \in \mathcal{D}(X)$  est

$$\mathbb{D}_f(A) = \mathcal{H}om(A, f^!(\mathbf{1}_Y))$$

## Proposition 2.4.7

Soit  $A \in \mathcal{D}(X)$  un objet f-lisse, de co-adjoint  $B \in \mathcal{D}(X)$ .

- 1. *B* est *f*-lisse, de co-adjoint *A*.
- 2. Il y a une équivalence de foncteurs

$$B \otimes f^*(-) \simeq \mathcal{H}om(A, f^!(-)) : \mathcal{D}(Y) \to \mathcal{D}(X)$$

3. Le morphisme naturel

$$A \to \mathbb{D}_f(\mathbb{D}_f(A))$$

est une équivalence.

4. La formation du dual de Verdier commute au changement de base.

# Proposition 2.4.10

Un objet  $A \in \mathcal{D}(X)$  est f-lisse si et seulement si le morphisme naturel

$$\operatorname{pr}_1^*(A) \otimes \operatorname{pr}_2^*(\mathbb{D}_f(A)) \to \operatorname{\mathcal{H}\mathit{om}}(\operatorname{pr}_2^*(A),\operatorname{pr}_1^!(A))$$

est un isomorphisme.

# Proposition 2.4.10

Un objet  $A \in \mathcal{D}(X)$  est f-lisse si et seulement si le morphisme naturel

$$\operatorname{pr}_1^*(A) \otimes \operatorname{pr}_2^*(\mathbb{D}_f(A)) \to \operatorname{\mathcal{H}\mathit{om}}(\operatorname{pr}_2^*(A),\operatorname{pr}_1^!(A))$$

est un isomorphisme.

#### Proposition 2.4.12

Un objet  $A \in \mathcal{D}(X)$  est f-propre si et seulement si le morphisme naturel

$$f_!(A \otimes \operatorname{pr}_{2*}(\mathcal{H}om(\operatorname{pr}_1^*(A), \Delta_{f!}(\mathbf{1}_X)))) \to f_*\mathcal{H}om(A, A)$$

est un isomorphisme.

#### Définition 2.5.1 (Morphisme cohomologiquement propre

Un morphisme  $f: X \to Y$  dans E est cohomologiquement propre lorsque

- 1. *f* est *n*-tronqué pour un certain *n*;
- 2.  $\mathbf{1}_X \in \mathcal{D}(X)$  est f-propre;
- 3.  $\Delta_f: X \to X \underset{Y}{\times} X$  est cohomologiquement propre (ou une équivalence).

## Définition 2.5.1 (Morphisme cohomologiquement propre)

Un morphisme  $f: X \to Y$  dans E est cohomologiquement propre lorsque

- 1. *f* est *n*-tronqué pour un certain *n*;
- 2.  $\mathbf{1}_X \in \mathcal{D}(X)$  est f-propre;
- 3.  $\Delta_f: X \to X \underset{\gamma}{\times} X$  est cohomologiquement propre (ou une équivalence).

# Proposition 2.5.2

Soit  $f: X \to Y$  un morphisme dans E tel que  $\Delta_f$  soit cohomologiquement propre.

1. Il y a une transformation naturelle

$$f_! \rightarrow f_*$$

- 2. Cette transformation est une équivalence lorsque f est cohomologiquement propre.
- 3. f est cohomologiquement propre si et seulement si  $f_!(\mathbf{1}_X) \to f_*(\mathbf{1}_X)$  est une équivalence.

#### Définition 2.5.3 (Morphisme cohomologiquement étale

Un morphisme  $f: X \to Y$  dans E est cohomologiquement étale lorsque

- (i). *f* est *n*-tronqué pour un certain *n*;
- (ii).  $\mathbf{1}_X \in \mathcal{D}(X)$  est f-lisse;
- (iii).  $\Delta_f: X \to X \underset{Y}{\times} X$  est cohomologiquement étale (ou une équivalence).

## Définition 2.5.3 (Morphisme cohomologiquement étale)

Un morphisme  $f: X \to Y$  dans E est cohomologiquement étale lorsque

- (i). *f* est *n*-tronqué pour un certain *n*;
- (ii).  $\mathbf{1}_X \in \mathcal{D}(X)$  est f-lisse;
- (iii).  $\Delta_f: X \to X \underset{V}{\times} X$  est cohomologiquement étale (ou une équivalence).

# Proposition 2.5.4

Soit  $f: X \to Y$  un morphisme dans E tel que  $\Delta_f$  soit cohomologiquement étale.

1. Il y a une transformation naturelle

$$f^! \rightarrow f^*$$

- 2. Cette transformation est une équivalence lorsque f est cohomologiquement étale.
- 3. f est cohomologiquement étale si et seulement si $f^!(\mathbf{1}_Y) \to \mathbf{1}_X$  est une équivalence.

#### Définition 3.1.1 (Schéma dérivé)

Un sch'ema d'eriv'e est un espace topologique X muni d'un faisceau d'anneaux animés  $\mathscr{O}_X$  tel que  $(X,\pi_0\mathscr{O}_X)$  est un schéma et chaque  $\pi_i\mathscr{O}_X$  est un  $\pi_0\mathscr{O}_X$ -module quasi-cohérent. Un morphisme de sch'emas d'eriv'es  $(X,\mathscr{O}_X) \to (Y,\mathscr{O}_Y)$  est une application continue  $f:X\to Y$  accompagnée d'un morphisme de faisceaux  $f^\sharp:f^{-1}\mathscr{O}_Y\to\mathscr{O}_Y$  induisant un morphisme de schémas classiques.

#### Définition 3.1.1 (Schéma dérivé)

Un schéma dérivé est un espace topologique X muni d'un faisceau d'anneaux animés  $\mathscr{O}_X$  tel que  $(X,\pi_0\mathscr{O}_X)$  est un schéma et chaque  $\pi_i\mathscr{O}_X$  est un  $\pi_0\mathscr{O}_X$ -module quasi-cohérent. Un morphisme de schémas dérivés  $(X,\mathscr{O}_X) \to (Y,\mathscr{O}_Y)$  est une application continue  $f:X\to Y$  accompagnée d'un morphisme de faisceaux  $f^\sharp:f^{-1}\mathscr{O}_Y\to\mathscr{O}_Y$  induisant un morphisme de schémas classiques.

#### Remarque

Un schéma dérivé est dit *affine* lorsque le schéma classique  $(X, \pi_0 \mathcal{O}_X)$  est affine.

## Définition 3.1.2 (Module animé plat, morphisme d'anneaux plat)

Soit A un anneau animé. Un A-module M est plat lorsque  $\pi_0(M)$  est un  $\pi_0(A)$ -module plat et que, pour tout n, le morphisme induit

$$\pi_0(M) \underset{\pi_0(A)}{\otimes} \pi_n(A) \to \pi_n(M)$$

est un isomorphisme.

Un morphisme d'anneaux animés  $A \rightarrow B$  est plat lorsqu'il fait de B un A-module plat.

### Définition 3.1.3 (Morphisme de schémas dérivés plat)

Un morphisme de schémas dérivés  $f: X \to Y$  est plat lorsque, pour tout ouvert affine  $U \subset X$  et  $V = f(U) \subset Y$ , le morphisme d'anneaux animés induit en sections globales  $\Gamma(V) \to \Gamma(U)$  est plat.

#### Définition 3.1.3 (Morphisme de schémas dérivés plat)

Un morphisme de schémas dérivés  $f: X \to Y$  est *plat* lorsque, pour tout ouvert affine  $U \subset X$  et  $V = f(U) \subset Y$ , le morphisme d'anneaux animés induit en sections globales  $\Gamma(V) \to \Gamma(U)$  est plat.

#### Définition 3.1.4 (Morphisme étale, lisse)

Un morphisme de schémas dérivés est

*étale* lorsqu'il est plat et induit un morphisme étale de schémas classiques; *lisse* lorsqu'il est plat et induit un morphisme lisse de schémas classiques.

#### Définition 3.1.5 (Faisceau quasi-cohérent

Pour un anneau animé R, on note  $\mathcal{D}(R)$  l' $\infty$ -catégorie dérivée des faisceaux de modules sur  $\operatorname{Spec}(R)$ .

#### Définition 3.1.5 (Faisceau quasi-cohérent

Pour un anneau animé R, on note  $\mathcal{D}(R)$  l' $\infty$ -catégorie dérivée des faisceaux de modules sur  $\operatorname{Spec}(R)$ .

On note  $\mathcal{D}_{qc}(X)$  l' $\infty$ -catégorie dérivée des faisceaux *quasi-cohérents* sur X.

## Définition 3.1.5 (Faisceau quasi-cohérent)

Pour un anneau animé R, on note  $\mathcal{D}(R)$  l' $\infty$ -catégorie dérivée des faisceaux de modules sur  $\operatorname{Spec}(R)$ .

On note  $\mathcal{D}_{qc}(X)$  l' $\infty$ -catégorie dérivée des faisceaux *quasi-cohérents* sur X.

#### Définition 3.1.6 (Faisceau pseudo-cohérent, cohérent)

Soit A un anneau animé. Un complexe  $K \in \mathcal{D}(A)$  est pseudo-cohérent lorsque, pour tout n, il existe un complexe parfait  $K_n$  et un morphisme  $K_n \to K$  dont le cône est en degré supérieur à n; cohérent lorsqu'il est pseudo-cohérent et borné.

# Définition 3.1.5 (Faisceau quasi-cohérent)

Pour un anneau animé R, on note  $\mathcal{D}(R)$  l' $\infty$ -catégorie dérivée des faisceaux de modules sur  $\operatorname{Spec}(R)$ .

On note  $\mathcal{D}_{qc}(X)$  l' $\infty$ -catégorie dérivée des faisceaux *quasi-cohérents* sur X.

#### Définition 3.1.6 (Faisceau pseudo-cohérent, cohérent)

Soit A un anneau animé. Un complexe  $K \in \mathcal{D}(A)$  est pseudo-cohérent lorsque, pour tout n, il existe un complexe parfait  $K_n$  et un morphisme  $K_n \to K$  dont le cône est en degré supérieur à n; cohérent lorsqu'il est pseudo-cohérent et borné.

On note  $\operatorname{Perf}(X)$  l' $\infty$ -catégorie des complexes parfaits de  $\mathscr{O}_X$ -modules. On note  $\operatorname{Coh}(X)$  l' $\infty$ -catégorie des complexes cohérents de  $\mathscr{O}_X$ -modules.

## Définition 3.1.5 (Faisceau quasi-cohérent)

Pour un anneau animé R, on note  $\mathcal{D}(R)$  l' $\infty$ -catégorie dérivée des faisceaux de modules sur  $\operatorname{Spec}(R)$ .

On note  $\mathcal{D}_{qc}(X)$  l' $\infty$ -catégorie dérivée des faisceaux *quasi-cohérents* sur X.

#### Définition 3.1.6 (Faisceau pseudo-cohérent, cohérent)

Soit A un anneau animé. Un complexe  $K \in \mathcal{D}(A)$  est pseudo-cohérent lorsque, pour tout n, il existe un complexe parfait  $K_n$  et un morphisme  $K_n \to K$  dont le cône est en degré supérieur à n; cohérent lorsqu'il est pseudo-cohérent et borné.

On note  $\operatorname{Perf}(X)$  l' $\infty$ -catégorie des complexes parfaits de  $\mathscr{O}_X$ -modules. On note  $\operatorname{Coh}(X)$  l' $\infty$ -catégorie des complexes cohérents de  $\mathscr{O}_X$ -modules.

#### Remarque

$$\mathcal{D}_{qc}(X) = Ind(Perf(X))$$

#### Définition 3.1.7 (Schéma dérivé noethérien)

Un schéma dérivé X est *noethérien* lorsque le schéma classique  $(X, \pi_0 \mathscr{O}_X)$  est noethérien et que  $\pi_i \mathscr{O}_X$  est un  $\pi_0 \mathscr{O}_X$ -module cohérent pour tout i.

#### Définition 3.1.7 (Schéma dérivé noethérien)

Un schéma dérivé X est *noethérien* lorsque le schéma classique  $(X, \pi_0 \mathscr{O}_X)$  est noethérien et que  $\pi_i \mathscr{O}_X$  est un  $\pi_0 \mathscr{O}_X$ -module cohérent pour tout i.

#### Théorème 3.1.8

Soit  $(X,\mathscr{O}_X)$  un schéma dérivé cohérent. Alors  $K\in\mathcal{D}_{\mathrm{qc}}(X)$  est pseudo-cohérent si et seulement si tous les  $\pi_iK$  sont des  $\pi_0\mathscr{O}_X$ -modules cohérents.

#### Définition 3.1.7 (Schéma dérivé noethérien)

Un schéma dérivé X est *noethérien* lorsque le schéma classique  $(X, \pi_0 \mathscr{O}_X)$  est noethérien et que  $\pi_i \mathscr{O}_X$  est un  $\pi_0 \mathscr{O}_X$ -module cohérent pour tout i.

#### Théorème 3.1.8

Soit  $(X, \mathscr{O}_X)$  un schéma dérivé cohérent. Alors  $K \in \mathcal{D}_{qc}(X)$  est pseudo-cohérent si et seulement si tous les  $\pi_i K$  sont des  $\pi_0 \mathscr{O}_X$ -modules cohérents.

#### Remarque

En particulier, toute troncature de *K* est alors pseudo-cohérente.

#### Définition 3.1.9 (Morphisme presque de présentation finie

Un morphisme d'anneaux animés  $f:A\to B$  est presque de présentation finie lorsqu'il existe une factorisation

$$A \to A[X_1,\ldots,X_n] \to B$$

telle que B est un  $A[X_1, \ldots, X_n]$ -module pseudo-cohérent.

# Définition 3.1.9 (Morphisme presque de présentation finie)

Un morphisme d'anneaux animés  $f:A\to B$  est presque de présentation finie lorsqu'il existe une factorisation

$$A \to A[X_1,\ldots,X_n] \to B$$

telle que B est un  $A[X_1, ..., X_n]$ -module pseudo-cohérent.

# Définition 3.1.10 (Morphisme propre)

Un morphisme de schémas dérivés est *propre* lorsqu'il est presque de présentation finie et qu'il induit un morphisme propres de schémas classiques.

#### Définition 3.1.9 (Morphisme presque de présentation finie)

Un morphisme d'anneaux animés  $f:A\to B$  est presque de présentation finie lorsqu'il existe une factorisation

$$A \to A[X_1,\ldots,X_n] \to B$$

telle que B est un  $A[X_1, \ldots, X_n]$ -module pseudo-cohérent.

## Définition 3.1.10 (Morphisme propre)

Un morphisme de schémas dérivés est *propre* lorsqu'il est presque de présentation finie et qu'il induit un morphisme propres de schémas classiques.

#### Théorème 3.1.11

Soit  $f:X\to Y$  un morphisme propre de schémas dérivés quasi-compacts et quasi-cohérents. Alors  $f^*$  préserve la pseudo-cohérence et la cohérence. De plus, lorsque f est de Tor-dimension finie,  $f^*$  préserve la perfection.

## Proposition 3.2.1

Soit  $f: X \to Y$  un morphisme de  $\mathcal{C}$ . Alors  $f^*$  admet un co-adjoint co-continu qui vérifie les formules de projections et de changement de base.

#### Proposition 3.2.1

Soit  $f:X\to Y$  un morphisme de  $\mathcal C$ . Alors  $f^*$  admet un co-adjoint co-continu qui vérifie les formules de projections et de changement de base.

## Proposition 3.2.2

Soit  $f:X\to Y$  un morphisme propre de Tor-dimension finie. Alors  $f^*$  admet un adjoint  $f_\sharp$  vérifiant les formules de projection et de changement de base, donné par

$$\begin{array}{cccc} f_{\sharp} & : & \operatorname{Ind}(\operatorname{Perf}(X)) & \to & \operatorname{Ind}(\operatorname{Perf}(Y)) \\ & & \operatorname{colim}_{i} P_{i} & \mapsto & \operatorname{colim}_{i}(f_{*}(P_{i}^{\vee}))^{\vee} \end{array}$$

#### Proposition 3.2.1

Soit  $f:X\to Y$  un morphisme de  $\mathcal C$ . Alors  $f^*$  admet un co-adjoint co-continu qui vérifie les formules de projections et de changement de base.

#### Proposition 3.2.2

Soit  $f:X\to Y$  un morphisme propre de Tor-dimension finie. Alors  $f^*$  admet un adjoint  $f_\sharp$  vérifiant les formules de projection et de changement de base, donné par

$$\begin{array}{cccc} f_{\sharp} & : & \operatorname{Ind}(\operatorname{Perf}(X)) & \to & \operatorname{Ind}(\operatorname{Perf}(Y)) \\ & & \operatorname{colim}_{i}P_{i} & \mapsto & \operatorname{colim}_{i}(f_{*}(P_{i}^{\vee}))^{\vee} = \operatorname{colim}_{i}\operatorname{\mathcal{H}om}(f_{*}\operatorname{\mathcal{H}om}(P_{i},\mathscr{O}_{X}),\mathscr{O}_{Y}) \end{array}$$

## Tout est propre

#### Théorème 3.2.3

Pour tout morphisme propre de Tor-dimension finie  $f:X\to Y$  ,  $\mathscr{O}_X$  est f-lisse.

## Tout est propre

#### Théorème 3.2.3

Pour tout morphisme propre de Tor-dimension finie  $f: X \to Y$ ,  $\mathcal{O}_X$  est f-lisse.

#### Remarque

En particulier,

$$\omega_f \simeq \mathbb{D}_f(\mathscr{O}_Y)$$

## Tout est propre

#### Théorème 3.2.3

Pour tout morphisme propre de Tor-dimension finie  $f: X \to Y$ ,  $\mathscr{O}_X$  est f-lisse.

#### Remarque

En particulier,

$$\omega_f \simeq \mathbb{D}_f(\mathscr{O}_Y)$$

#### Proposition 3.2.4

Soit  $f:X\to Y$  un morphisme propre et lisse de schémas dérivés. Alors f et  $\Delta_f$  sont cohomologiquement lisses.

De plus, le dualisant de f est  $\otimes$ -inverse du dualisant de  $\Delta_f$ , et est donc local sur X.

# P immersions ouvertes, I propres et Tor-dimension finie

### Théorème 3.2.5 (Compactification de Nagata dérivée)

Soit  $f: X \to Y$  un morphisme presque de présentation finie entre schémas dérivés. Alors il existe une factorisation

$$X \stackrel{j}{\rightarrowtail} \overline{X} \stackrel{\overline{f}}{\longrightarrow} Y$$

avec j une immersion ouverte et  $\bar{f}$  un morphisme propre.

## P immersions ouvertes, I propres et Tor-dimension finie

#### Théorème 3.2.5 (Compactification de Nagata dérivée)

Soit  $f: X \to Y$  un morphisme presque de présentation finie entre schémas dérivés. Alors il existe une factorisation

$$X \stackrel{j}\rightarrowtail \overline{X} \stackrel{\overline{f}}\to Y$$

avec j une immersion ouverte et  $\bar{f}$  un morphisme propre.

#### Proposition 3.2.6

Dans le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc}
X' & \xrightarrow{g'} & X \\
f' \downarrow & & \downarrow f \\
Y' & \xrightarrow{g} & Y
\end{array}$$

où f est propre et de Tor-dimension finie et g est une immersion ouverte, le morphisme naturel

$$f_{\sharp}g'_{*} \rightarrow g_{*}f'_{\sharp}$$

est une équivalence.

# Remplacer Ind(Perf) par Pro(Perf)

$$\mathcal{D}_{qc}(X) = Pro(Perf(X)) = Ind(Perf(X)^{op})^{op}$$

# Remplacer Pro(Perf) par Pro(Coh)

#### Théorème 3.2.8

Le foncteur

$$X \mapsto \operatorname{Pro}(\operatorname{Coh}(X))$$

s'étend en un formalisme à six foncteurs, avec I la classe des immersions ouvertes et P la classe des morphismes propres.

# Remplacer Pro(Perf) par Pro(Coh)

#### Théorème 3.2.8

Le foncteur

$$X \mapsto \operatorname{Pro}(\operatorname{Coh}(X))$$

s'étend en un formalisme à six foncteurs, avec I la classe des immersions ouvertes et P la classe des morphismes propres.

#### Proposition 3.2.9

Soit  $f:X\to Y$  un morphisme séparé de schémas dérivés noethériens presque de type fini. Soit  $K\in \operatorname{Coh}(X)\subset\operatorname{Pro}(\operatorname{Coh}(X))$  de Tor-dimension finie sur Y. Alors K est f-lisse.

# Remplacer Pro(Perf) par Pro(Coh)

#### Théorème 3.2.8

Le foncteur

$$X \mapsto \operatorname{Pro}(\operatorname{Coh}(X))$$

s'étend en un formalisme à six foncteurs, avec I la classe des immersions ouvertes et P la classe des morphismes propres.

#### Proposition 3.2.9

Soit  $f: X \to Y$  un morphisme séparé de schémas dérivés noethériens presque de type fini. Soit  $K \in \text{Coh}(X) \subset \text{Pro}(\text{Coh}(X))$  de Tor-dimension finie sur Y. Alors K est f-lisse.

En particulier, si Y est un schéma classique régulier, alors tout  $K \in Coh(X)$  est f-lisse et Coh(X) est auto-dual par la dualité de Verdier

$$\mathbb{D}_f(K) = \mathcal{H}om(K, f^! \mathcal{O}_Y)$$

# Remplacer Pro(Coh) par Ind(Coh)



# Remplacer Pro(Coh) par Ind(Coh)

$$X \mapsto \mathcal{D}_{qc}(X)$$

$$X \mapsto \operatorname{Ind}(\operatorname{Coh}(X))$$

# Remplacer Pro(Coh) par Ind(Coh)

$$X \mapsto \mathcal{D}_{qc}(X)$$

$$X \mapsto \operatorname{Ind}(\operatorname{Coh}(X))$$

$$\mathcal{D}_{qc}(X) = Ind(Perf(X)) \simeq Ind(Perf(X)^{op}) \rightarrow Ind(Coh(X)^{op}) \simeq Ind(Coh(X)) = IndCoh(X)$$

# Merci de votre attention

## Bibliographie

- Peter Scholze, Six-Functor Formalisms, 2022
- Lucas Mann, A p-Adic 6-Functor Formalism in Rigid-Analytic Geometry, 2022
- Jacob Lurie, Higher Topos Theory. Princeton, 2009.
- Jacob Lurie, Higher Algebra. Harvard, 2017.
- Kerodon et nLab.